53. Rapport de l'état dans lequel a été trouvé le fœtus presenté à l'academie Roïale de chirurgie, le jeudi ~~4~~ 5 novembre dernier.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

L'Academie a desiré avoir 1° un dessein d'un fœtus feminin à terme, qui fut presenté à sa seance du jeudi 5. 9bre dernier. 2° Quelle pouvoit être la liqueur contenuë dans une grosse tumeur, située au côté gauche du col de ce fœtus, occupant l'espace compris depuis le bas de l'oreille jusqu'au moignon de l'épaule gauche; laquelle tumeur en avoit d'abord imposé à la sage femme, pour la tête de l'enfant. 3° d'être instruite de la cause qui pouvoit rendre le ventre de ce foetus si monstreux, attendu que par le toucher, on l'apercevoit resistant, élastique, et sans fluctuation. 4° Enfin, d'avoir quelques notions des differences de ce fœtus, avec les autres.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Pour satisfaire au premier desir de l'Academie, j'ai fait dessiner ce fœtus par M. Mondon, Dessinateur du Roy, et des Academies d'architecture et de peinture.

2° Aiant ramassé dans un même point, autant qu'il a été possible, le fluide contenu dans la tumeur, un coup de troisquarts en a tiré une serosité sanguinolente à la quantité d'une chopine. Immediatement aprés cette évacuation, une incision cruciale sur l'étanduë de la tumeur, a fait connoître que la peau

ARC 26 n° 50

étoit extremement mince, et que la liqueur sortie, étoit renfermée dans un Kiste comme aponévrotique, fort adhérant à la peau et à son voisinage, trés uni et lisse endedans, puisquil avoit quelque rassemblance à l'interieur du peritoine. Cette incision a encore donné la facilité d'appercevoir deux autres tumeurs membranneuses extremement minces, et renfermées dans la premiere, une assez grosse située anterieurement, et l'autre plus petite située plus posterieurement. L'une et l'autre ont fourni une humeur sanguinolente semblable à celle de la tumeur commune.

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

3°. Par un coup de troisquarts dans le bas ventre, il en est sorti environ une pinte et demie d'une serosité semblable à une urine citronée trés-claire. L'ouverture entiere de cette capacité, fit remarquer que le tissu cellulaire, les muscles et le peritoine, étoient telement infiltrés d'une pareille serosité, qu'ils avoient acquis tous ensemble, l'épaisseur de deux travars de doigt. Voila précisement cequi a derobé la conoissance de la fluctuation. Au surplus les visceres étoient dans l'état naturel, si ce n'est que le mezantere étoit parsemé d'une infinité de glandes obstruées, que l'appendice vermiforme étoit a peine sensible. — Quand à la poitrine, il y avoit une grande quantité de serosité entre les deux sacs de la plevre qui construisent la

mediastin, sans qu'il y en eût sur les côtés, les visceres étant d'ailleurs fort ~~tout~~ sains.

4°. Les conformations singulieres dans ce fœtus, — sont plus nombreuses dans les mains, puisque le pouce de la main droite est aussi long et aussi gros, qu'il l'est ordinairement à l'âge de douze à quinze ans. 2°. Le doigt indice de la même main, excede les autres en grosseur et en longueur 3°. Le doigt indice de la main gauche, est aussi plus gros et plus longs que les autres doigts de cette main. — Enfin l'anus étoit placé plus posterieurement et plus haut qu'il n'a coutume de l'être, et ~~avoit~~ laissoit de la vulve à lui, deux travers de doigts de distance.

On peut remarquer que ces variations singulieres de quelques doigts des mains de ce fœtus, prouvent l'attention et l'exactitude scrupuleuse du Dessinateur.

A Paris le 25. novembre 1750. R. Voillant de Garengeot

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE